


#40553 - Beslutningstaking om PCI eller trombolyse



Kontraindikasjon mot trombolyse

- Tidligere hjerneblødning eller hjerneslag av ukjent årsak
- Iskemisk hjerneslag siste 6 måneder

- Intrakraniell skade, svulst eller AV- malformasjon
- Større traume eller kirurgi eller hodeskade siste måned
- Blødning fra mage/tarm siste måned
- Kjent blødningstilstand (unntatt menstruasjon)
- Aorta-disseksjon
- Ikke-komprimerbar punksjon siste 24 timer (e.g. leverbiopsi, spinalpunksjon)

Forsiktighetsregler for trombolyse

- TIA siste 6 måneder
- Peroral antikoagulasjonsbehandling (OAK)
- Graviditet eller første uke etter fødsel
- Vedvarende sys BT > 180 eller dia BT > 110 mmHg tross smertebehandling
- Alvorlig leversykdom eller kreft med spredning
- Mistanke om perikarditt
- Langvarig (>10 min) eller traumatisk HLR
- Alder > 75 år

Grunnlagsinformasjon

Forfatter: Thomas Wilson, Svein Arne Monsen, Gunnar Vangberg, Per Chr Juvkam, Alf Stolt Nielsen, Dag Aarhus, Per Kristian Hyldmo, Kåre Harald Bønaa

Versjon 1: Sist oppdatert 5.2.14

Versjon 2: Sist oppdatert 13.1.22

Versjon 3: 16.9.24

Revideres innen: 16.9.27

Godkjent av: Per Christian Juvkam