

Pasientinformasjon

Til diabetikere med moderat nyresvikt, som får røntgenkontrast i blodet og som bruker medikamenter som inneholder virkestoffet metformin.

Disse medikamentene inneholder alle metformin: **Glucophage®**, **Metformin®**, **Janumet®**, **Eucreas®**, **Xigduo®**, **Jentadueto®** og **Synjardy®**.

I noen tilfeller kan disse medikamentene sammen med røntgenkontrast satt i blodet føre til en reduksjon av nyrefunksjonen.

Blodprøver viser at du har moderat nyresvikt. Vi ber derfor om at du ikke tar medikamenter som inneholder metformin før du har tatt en ny blodprøve hos din egen lege.

Forholdsregler

1. Ingen av de ovenstående medikamentene skal tas etter at du har fått røntgenkontrast i blodet. Andre medikamenter kan tas som vanlig.
2. To dager etter undersøkelsen oppsøker du egen lege for å kontrollere nyrefunksjonen. Denne kontrollen er en enkel blodprøve. Ta med dette skrevet til legen.
3. Start aldri med det aktuelle medikamentet før du har fått klarsignal fra egen lege.

Informasjon til legen

Din pasient (navn og f.dato): _____ bruker et medikament som inneholder metformin. I forbindelse med at pasienten skulle få injeksjon av røntgenkontrast hos oss ble nyrefunksjonen kontrollert med eGFR som viste _____. Hos pasienter med nyresvikt kan røntgenkontrast gi en forbigående ytterligere reduksjon av nyrefunksjonen. Bruk av metformin ved nyresvikt kan i noen tilfeller utløse en metabolsk acidose. Pasienten har derfor fått beskjed om ikke å ta metformin før fastlegen har kontrollert nyrefunksjonen og gitt klarsignal til videre bruk. Hvis vedvarende nyresvikt med eGFR under 30, kan metformin være kontraindisert, jfr Felleskatalogen.